

ANAPHYLAXIE

(Schwere allergische Reaktion)

Worauf man achten soll:




Die Symptome können schnell auftreten und mehr als einen Teil des Körpers betreffen.



SCHWELLUNGEN

Geschwollene Lippen, Augen, Zunge oder Hals



ATEMNOT

Atembeschwerden, Keuchen oder Veränderung der Stimme




SCHWINDEL

Schwindel, Schwäche oder Ohnmacht



ANGSTGEFÜHL

Das plötzliche Gefühl, dass etwas nicht stimmt



HAUT

Hautausschlag, Juckreiz, Nesselsucht



BAUCH

Starke Bauchschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen



Handeln Sie schnell – verwenden Sie ein Adrenalin-Notfallgerät und rufen Sie den Notruf.



Was mache ich in einem Notfall?



Bei einer anaphylaktischen Reaktion zählt jede Sekunde!



Das Notfallprotokoll befindet sich im Notfallset (falls vorhanden).

1

Verwenden Sie das Adrenalin-Notfallgerät sofort.



INJEKTOR

ODER



NASENSPRAY

2

Lage der Person:

- Bei Atemnot: sitzende Position
- Bei Schwindel oder Schwäche: liegende Position mit leicht erhöhten Beinen



3

Rufen Sie die 112 an und sagen Sie „Anaphylaxie“. Geben Sie den Standort an und bleiben Sie am Telefon.

112



4

Wenn ein Asthma-Inhalator verschrieben wurde, verwenden Sie ihn nach der Adrenalingabe.



5

Wenn keine Besserung eintritt, geben Sie nach 5–10 Minuten eine zweite Adrenalindosis.



5–10
Min.

6

Befolgen Sie das Notfallprotokoll für die weitere Behandlung.



Das Notfallset sollte immer griffbereit sein!

