


ANAPHYLAXIE

(Réaction allergique sévère)

Symptômes à surveiller :



Les symptômes peuvent apparaître rapidement et toucher **plus d'une partie du corps**.




GONFLEMENTS

Lèvres, yeux, langue ou gorge gonflés




RESPIRATION

Essoufflement, sifflements ou changement de voix




ÉTOURDISSEMENTS

Étourdissements, faiblesse ou évanouissement



SENSATION DE MALHEUR

Sensation soudaine que quelque chose ne va pas



PEAU

Éruption cutanée, démangeaisons, urticaire



ESTOMAC

Douleurs abdominales intenses, nausées ou vomissements



Agissez rapidement – utilisez un dispositif d'adrénaline et appelez les secours.



Que faire en cas d'urgence allergique ?



L'anaphylaxie est une urgence médicale – chaque seconde compte !



Le protocole d'urgence est dans la trousse d'urgence (si disponible).

1

Utilisez le dispositif d'adrénaline immédiatement.



OU



SPRAY NASAL

2

Positionnez la personne :

- En cas de difficultés respiratoires: gardez-la assise
- En cas de vertiges: allongez-la à plat avec les pieds légèrement surélevés



3


Appelez le 112 et dites « anaphylaxie ». Donnez la localisation et restez en ligne.

112



4

Si un inhalateur est prescrit, utilisez-le après l'adrénaline.



5


Si pas d'amélioration, administrez une seconde dose d'adrénaline après 5 à 10 minutes.



5–10 min.

6

Suivez le protocole d'urgence pour le traitement supplémentaire.



La trousse d'urgence doit toujours être facilement accessible !

